

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

原末・牛車腎気丸

ゲンマツ・ゴシャジンキガン

原末・牛車腎気丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|-------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりとすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等が見られ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるもの次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

用法・用量

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

| 年齢 | 1回量 |
|-----------|---------|
| 成人（15歳以上） | 20丸 |
| 15歳未満7歳以上 | 13丸 |
| 7歳未満4歳以上 | 10丸 |
| 4歳未満3歳以上 | 6丸 |
| 3歳未満 | 服用しないこと |

＜用法・用量に関連する注意＞

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

成分・分量

1日量（60丸）中

| | |
|-------|--------|
| ジオウ | 1.110g |
| サンシュユ | 0.555g |
| サンヤク | 0.555g |
| タクシャ | 0.416g |
| ブクリョウ | 0.416g |
| ポタンピ | 0.416g |
| ケイヒ | 0.139g |
| ブシ | 0.139g |
| ゴシツ | 0.416g |
| シャゼンシ | 0.416g |

添加物としてハチミツ、寒梅粉、バレイショデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4